

כוכב נשר 16.12.2011

שיח
כוכב נשר

בריאות

מחקר חדשני קובע: קדחת ים תיכונית גורמת לכבד שומני ולשחמת הכבד

במחקר חדשני של מומחים מביה"ח בני ציון, התגלתה לראשונה תופעה שאינה מוכרת בספרות הרפואית, המוצאת קשר ישיר בין המחלה לבין כבד שומני

באנזימי הכבד, להפתעת ד"ר רימר ופרופ' צוקרמן, ב-75% מהמקרים של כבד שומני על רקע FMF התגלתה חומרת מחלה קשה ולא כבד שומני "פשוט", האת על אף היעדר גורמי הסיכון המקובלים. נראה כי חומרת המחלה והשכיחות הגבוהה קשורות ישירות למחלת ה-FMF. מקרים אלו כוללים נזק בלתי הפיך הגורם לצלקות (פיברוזיס) ואף לשחמת הכבד. ד"ר רימר: "המחקר, שהצליח למצוא קשר ישיר בין חולי ה-FMF לבין הסיכון לכבד שומני עם ביטויים חמורים, תורם למודעות לסיכון הקיים ולמעקב אחר המטופלים, והוא בעל משמעות קלינית חשובה".

יצוין כי המחלקה הריאומטולוגית בבני ציון פועלת בהנהלתו של פרופ' יצחק רוזנר, ומזה שנים נמצאת בה מרפאה לטיפול בחולי קדחת ים תיכונית.



בית החולים בני ציון

מוגברת. כעת, בעקבות מחקר שהתקיים בשיתוף פעולה עם בית החולים כרמל, אובחנו 30 חולי FMF עם בעיית כבד חמורה על רקע כבד שומני. המצב המכונה כבד שומני נפוץ אצל כ-30% מהאוכלוסייה, וקשור רובו ככולו לגורמי סיכון, בעיקר השמנת יתר וסוכרת. הביטוי לצבירת השומן בכבד הינו הפרעה

ד"ר דורון רימר, רופא בכיר במחלקה הריאומטולוגית במרכז הרפואי בני ציון, תיאר לאחרונה, בשיתוף עם מנהל יחידת הכבד של המרכז הרפואי כרמל, פרופ' אלי צוקרמן, תופעה שאינה מוכרת בספרות הרפואית: שכיחות יתר של הפרעה באנזימי כבד בחולי קדחת ים תיכונית (FMF) עקב כבד שומני. יצוין כי מדובר בחלק ממחקר חדשני הזוכה לעניין בקרב הקהילה המדעית, אותו ערך ד"ר רימר, לפיו נמצא קשר ישיר בין מחלת ה-FMF לבין הסיכון לכבד שומני, עם ביטויים חמורים עד שחמת הכבד. FMF מסווגת כמחלה אוטואינפלמטורית, המאופיינת בהתקפים של חום ודלקות באיברי מטרה שונים, כגון מפרקים ומעטפת הריאה, המלווה בכאב עז החולף כעבור מספר ימים. דלקות התקפיות אלו נובעות מבעיה בקבוצת חלבונים תוך-תאיים הגורמים לפעילות דלקתית